Problemi sui vettori

Vettori in due dimensioni

Vett. 1

Dati i vettori $\mathbf{a} = 4.0 \hat{\mathbf{i}} + 3.0 \hat{\mathbf{j}} \text{ m}$, $\mathbf{b} = -4.0 \hat{\mathbf{i}} - 3.0 \hat{\mathbf{j}} \text{ m}$, $\mathbf{c} = -4.0 \hat{\mathbf{i}} + 3.0 \hat{\mathbf{j}} \text{ m}$ e $\mathbf{d} = 4.0 \hat{\mathbf{i}} - 3.0 \hat{\mathbf{j}} \text{ m}$:

- disegnarli su un sistema di assi coordinati cartesiani $\mathbf{O}(x,y)$,
- calcolare le coordinate polari ed indicarle sul grafico precedente.

Vett. 2

Dati due vettori $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$:

$$\mathbf{a} = -2.0 \hat{\mathbf{i}} + 1.0 \hat{\mathbf{j}} \text{ m} \quad \text{e} \quad \mathbf{b} = -1.0 \hat{\mathbf{i}} - 2.0 \hat{\mathbf{j}} \text{ m}$$

- Calcolare la somma ($\mathbf{s}$) e la differenza ($\mathbf{d}$).
- Quali sono modulo, direzione e verso di $\mathbf{s} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$ e $\mathbf{d} = \mathbf{a} - \mathbf{b}$, rispetto ad all'asse x?
- Disegnare i vettori $\mathbf{s}$ e $\mathbf{d}$ su un sistema cartesiano di assi coordinati $\mathbf{O}(x,y)$.
- Ricavare le coordinate polari di $\mathbf{s}$ e $\mathbf{d}$ in funzione delle coordinate cartesiane e indicarle rispettivamente sul sistema cartesiano $\mathbf{O}(x,y)$.
- Trovare per i vettori $\mathbf{s}$ e $\mathbf{d}$ per i relativi versori ($\hat{\mathbf{s}}$ e $\hat{\mathbf{d}}$) e moduli e rappresentarli in funzione dei versori.

Vett. 3

Due vettori $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ hanno modulo uguale $a = |\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = b = 10.0 \text{ m}$, ma sono orientati come mostrato in figura, con $\theta_1 = 30.0^\circ$ e $\theta_2 = 105^\circ$. Si trovi il vettore

- somma $\mathbf{s} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$, la sua componente x ed il componente y, la componente y ed il componente x.
- Il modulo di $\mathbf{s}$, e fornire la direzione e verso rispetto all'asse x.
- Fornire le rispettive coordinate polari (ρ, ϕ) ed indicarle sul grafico.

Vett. 4

Si verifichi sul un sistema di assi coordinati $\mathbf{O}(x,y)$ che il prodotto scalare $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = ab \cos \mathcal{G}$, dove a è il modulo del vettore $\mathbf{a}$, b il modulo del vettore $\mathbf{b}$ e $\mathcal{G}$ l'angolo tra i due vettori, è pari al prodotto delle componenti secondo la relazione $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_x b_x + a_y b_y$.

Verificare inoltre che il prodotto scalare $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ indica sia la proiezione di $\mathbf{a}$ su $\mathbf{b}$ per b ed equivalentemente la proiezione di $\mathbf{b}$ su $\mathbf{a}$ per a .

Vett. 5

Ricavare la legge del coseno (di Carnot) per un triangolo qualsiasi, mediante l'utilizzo del prodotto scalare tra due vettori $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ e ricavare il teorema di Pitagora come caso particolare in cui θ l'angolo tra $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ è pari a $\pi/2$.

Ricavare la legge dei seni valida per un triangolo qualsiasi mediante l'utilizzo del prodotto vettoriale.

Dedurre dalla definizione di prodotto vettoriale ($\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$), che il modulo del prodotto vettoriale è uguale all'area del parallelogramma individuato da $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$.

Vettori in 3 dimensioni

Vett. 6

Dato il vettore $\mathbf{a} = -3.0\hat{\mathbf{i}} + 2.0\hat{\mathbf{j}} - 2.0\hat{\mathbf{k}}$ ed il vettore $\mathbf{b} = 3.0\hat{\mathbf{i}} - 2.0\hat{\mathbf{j}} + 2.0\hat{\mathbf{k}}$,

- disegnare entrambi i vettori su un sistema di coordinate cartesiane.
- Trovare le coordinate polari sferiche e indicarle sul sistema cartesiano $\mathbf{O}(x,y,z)$.
- Trovare le coordinate polari cilindriche ed indicarle sul sistema cartesiano $\mathbf{O}(x,y,z)$.

Vett. 7

Tre vettori sono rappresentati da $\mathbf{a} = 3.0\hat{\mathbf{i}} + 3.0\hat{\mathbf{j}} - 2.0\hat{\mathbf{k}}$,
 $\mathbf{b} = -1.0\hat{\mathbf{i}} - 4.0\hat{\mathbf{j}} + 2.0\hat{\mathbf{k}}$ e $\mathbf{c} = 2.0\hat{\mathbf{i}} + 2.0\hat{\mathbf{j}} + 1.0\hat{\mathbf{k}}$

- si calcolino $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \wedge \mathbf{c})$, $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c})$, $\mathbf{a} \wedge (\mathbf{b} + \mathbf{c})$.
- Si disegni su assi coordinati cartesiani il vettore $\mathbf{a}$ ed il vettore $\mathbf{g} = \mathbf{a} \wedge (\mathbf{b} + \mathbf{c})$
- si dimostri che $\mathbf{g}$ è ortogonale ad $\mathbf{a}$.
- Si trovino le coordinate polari sferiche e cilindriche di $\mathbf{g}$, e si riportino graficamente su un sistema di assi coordinati cartesiani $\mathbf{O}(x,y,z)$.

Derivate di vettori e versori

Vett. 8

Si dimostri che, dato un vettore $\mathbf{W}$ di modulo costante nel tempo ($W(t)=\text{costante}$), la

$$\frac{d\mathbf{W}}{dt} \perp \mathbf{W}.$$

Vett. 9

Si ricavi che la derivata di un vettore unitario $\mathbf{u}$ risulta pari a $\left| \frac{d\mathbf{u}}{dt} \right| = \frac{d\varphi}{dt}$, si disegni il vettore $\mathbf{n}$,

rispetto a $\mathbf{u}(t)$ ed $\mathbf{u}(t+dt)$ tale che $\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \frac{d\varphi}{dt} \mathbf{n}$. Individuare il vettore $\boldsymbol{\omega}$ tale che

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{u}.$$

Verificare le relazioni $\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{u} = \omega \mathbf{n}$, $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{u} \wedge \frac{d\mathbf{u}}{dt}$ su grafico mediante la regola della mano destra.